



**Ivonne van de Ven Stichting**  
**Versterking suïcidepreventie in Nederland**

## Persbericht

Arnhem, 15 oktober 2019

### **Tweede Kamer neemt petitie in ontvangst: Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners**

**De petitie is 8852 keer ondertekend (15-10-2019)**

**De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitie<sup>1</sup> samen met een breed comité van aanbeveling.**

***De ondertekenaars willen bereiken dat alle artsen en hulpverleners - of ze nu opgeleid zijn in Groningen, Amsterdam of Maastricht - beschikken over de nodige bekwaamheden voor de behandeling van mensen met suïcidaal gedrag.***

***Quote ondertekenaar Tamara Baars: Maar zit suïcidepreventie dan nog niet in de opleidingen van zorgprofessionals? Dat lijkt me zo vanzelfsprekend!***



Om het aantal suïcides terug te dringen is het nodig suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de opleidingen van artsen en hulpverleners.

Dan hebben zorgprofessionals een goede basis als zij te maken krijgen met patiënten met suïcidaal gedrag. Nu ontbreekt het hen te vaak aan de nodige bekwaamheden. De veiligheid van kwetsbare patiënten is in het geding.

#### **De ondertekenaars vragen van de Tweede Kamer te bevorderen en te faciliteren:**

1. **Vastleggen in landelijke opleidingseisen:**...dat beroepsgroepen kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor suïcidepreventie, opnemen in hun opleidingsplannen met een focus op 2020. En dat zij daaruit consequenties trekken voor de landelijke opleidingseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante beroepsgroepen.
2. **Structurele plaats geven in de opleiding:** ...dat beroepsopleidingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor-

en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische opleidingen van de genoemde zorgprofessionals.

### **Verbijsterende feiten**

- Nabestaanden vertellen regelmatig over onveilige zorg voor hun dierbaren omdat artsen en hulpverleners handelingsverlegen zijn. <sup>ii</sup>
- Suïcidepreventie ontbreekt in de landelijke opleidingseisen van artsen en hulpverleners. <sup>iii</sup>
- Hulpverleners passen de geldende richtlijnen van hun beroep onvoldoende toe. <sup>iv</sup>

### **Suïcide raakt veel mensen**

Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Per suïcide gaat dit om ongeveer 135 mensen.

Er gaan te veel mensen dood door suïcide. Onnodig. Als de juiste hulp op het juiste moment voorhanden zou zijn geweest had het niet zo ver hoeven komen. En onvrijwillig. Want verreweg de meeste mensen die overlijden aan suïcide willen helemaal niet dood.

In 2018 stierven in Nederland 1829 mensen door suïcide (CBS). Zo'n 15.000 zelfbeschadigende pogingen leidden tot behandeling in het ziekenhuis.

Om suïcides te voorkomen is het van groot belang dat artsen en hulpverleners al in hun basisopleiding leren hoe met suïcidale patiënten om te gaan en daarbij samen te werken met naasten. Onderzoek o.a. van de WHO laat zien dat passende scholing van zorgprofessionals leidt tot minder suïcides.<sup>v</sup>

**Meer informatie:** [www.ivonnevandevenstichting.nl](http://www.ivonnevandevenstichting.nl)

Ida Bontius, secretaris Ivonne van de Ven Stichting (06 53749281)

Professor Ad Kerkhof (06 13979754)

*Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie telefoon: 0900-0113 of [www.113.nl](http://www.113.nl)*

---

<sup>i</sup> <https://voorkomsuicide.petities.nl>

<sup>ii</sup> <https://ivonnevandevenstichting.nl> zie: Verhalenbundel 2016, 2017 en 2018-2019

<sup>iii</sup> <https://ivonnevandevenstichting.nl/petitie/> zie: Achtergrond document professor Ad Kerkhof

<sup>iv</sup> <https://www.ggzrichtlijnen.nl/suïcidaal-gedrag> zie: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag

<sup>v</sup> Zie ook de volgende publicaties:

- Kapur, N., Ibrahim, S., While, D., Baird, A., Rodway, A., Hunt, I.M., Windfuhr, K., Moreton, A., Shaw, J., & Appleby, L., (2016). Mental health services changes, organizational factors, and patient suicide in England in 1997-2012: a before and after study. *The Lancet Psychiatry*, doi: 10.1016/S2215-0366(16)30023-2
- De Beurs, D.P., De Groot, M.H., De Keijser, J., Van Duijn, R.F.P. & Kerkhof, A.J.F.M. (2016). Evaluation of benefit to patients of training mental health professionals in suicide guidelines: cluster randomised trial. *British Journal of Psychiatry*. Doi: 10.1192/bjp.bp.114.156208)
- While D, Bickley H, Roscoe A, et al. Implementation of mental health service recommendations in England and Wales and suicide rates 1997-2006: a cross-sectional and before-and-after observational study. *Lancet*. 2012;379:1005-12
- De WHO en de IASP hebben het verbeteren van de opleidingen van artsen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg aangemerkt als een van de belangrijkste evidencebased strategieën in nationale suïcidepreventie programma's. Zie: National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators. ISBN 978-92-4-151501-6; © World Health Organization 2018.